



Patientenaufklärung

Basisinformation zum Aufklärungsgespräch (zum Verbleib beim Patienten)

Patient/in: Name, Vorname, Geb.-Datum

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD): Spiegelung des oberen Verdauungstraktes

Bitte vor dem Aufklärungsgespräch lesen und den Fragebogen ausfüllen!

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die Spiegelung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarmes stellt die häufigste und wichtigste Untersuchungsmethode dar, um Erkrankungen des oberen Verdauungstraktes möglichst früh zu erkennen und ggf. zu behandeln. Vor der Untersuchung werden Sie über die Notwendigkeit, die Vorbereitung, den Ablauf und mögliche Risiken persönlich informiert. Selbstverständlich können Sie jederzeit von der Untersuchung zurücktreten.

Spiegelung

Zur Spiegelung wird ein dünnes, biegsames optisches Gerät (Gastroskop) über Mund und Rachen in die Speiseröhre eingefügt und unter Sicht in den Magen und Zwölffingerdarm (Duodenum) weitergeschoben. Um die Sicht zu verbessern wird der Magen durch Einblasen von Luft entfaltet. In der Regel werden mit einer kleinen Zange Gewebeprobe(n) (Biopsie) zur feingeweblichen Untersuchung (Histologie) entnommen. Dieser Vorgang und die Spiegelung sind schmerzfrei. Es können allerdings unangenehme Empfindungen, insbesondere ein Würgereiz beim Einführen auftreten. Der Rachen kann örtlich betäubt werden, auf Wunsch erhalten Sie eine „Beruhigungsspritze“ (siehe Sedation). Die Untersuchung dauert in der Regel 5 – 7 Minuten.

Sedierung („Beruhigungsspritze“)

Auf Wunsch erhalten Sie vor der Gastroskopie eine „Beruhigungsspritze“ (Sedierung). Diese führt zu einer Entspannung und Schmerzbefreiung. Bei Bedarf kann diese intensiviert werden, so dass Sie die Untersuchung „verschlafen“ (Kurznarkose). Nach dem Eingriff werden Sie von Fachpersonal so lange überwacht, bis Sie ausreichend wach und alle Organfunktionen normal und stabil sind.

Sie müssen allerdings beachten, dass Ihr Reaktionsvermögen für eine gewisse Zeit beeinträchtigt ist. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie **danach kein Fahrzeug lenken, nicht am Verkehr teilnehmen**, keine Maschinen bedienen und keine Tätigkeit ausführen, bei denen Sie sich oder andere Personen gefährden könnten, und zwar bis zum nächsten Morgen. Sie sind in dieser Zeit auch nicht geschäftsfähig.

Wenn Sie eine Sedierung wünschen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie von einer erwachsenen Person abgeholt und nach Hause gebracht werden, um Komplikationen durch Störung der Orientierung und des Gleichgewichtes zu vermeiden (Sturzgefahr). Alternativ können Sie ein Taxi nehmen, wenn Sie der Taxifahrer bis an die Haustür bringt. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Begleitperson ist nicht gestattet.

Patientenaufklärung (Fortsetzung)

Basisinformation zum Aufklärungsgespräch (zum Verbleib beim Patienten)

Risiken/Komplikationen

Die Magenspiegelung ist ein sehr sicheres Routineverfahren. Trotz größter Sorgfalt kann es in Einzelfällen danach zu Komplikationen kommen, die in Ausnahmefällen im Verlauf auch lebensbedrohlich sein können. Da der Arzt unter Sicht arbeitet, ist eine Verletzung des Kehlkopfes oder eine Durchstoßung (Perforation) von Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm) extrem selten. In diesem unwahrscheinlichen Fall wäre eine Antibiotikatherapie zur Behandlung einer Mittel-, Rippen- oder Bauchfellentzündung sowie ggf. auch Operation unverzüglich erforderlich. Bei krankhaften Veränderungen kann das Risiko erhöht sein.

- Relevante Blutungen durch Gewebeentnahme oder Verletzungen sind äußerst selten und können in der Regel endoskopisch gestillt werden. Über Gerinnungsstörungen oder gerinnungshemmende Medikamente informieren Sie bitte den Arzt.
- Selten treten Herz-, Kreislaufreaktionen und Störungen der Atemfunktion auf, sehr selten bis hin zum Atemstillstand (insbesondere im Zusammenhang mit Beruhigungsmitteln).
- Selten treten schwerwiegende Unverträglichkeitserscheinungen auf (Beruhigungs- und Schmerzmittel)
- Selten treten Infektionen mit Fieber (antibiotisch gut behandelbar), sehr selten Keimausbreitung (Bakteriämie) bis hin zur Blutvergiftung (Sepsis) oder Herzinnenwandentzündung (Endokarditis) auf.
- Auch vorbereitende Maßnahmen (Venenzugang, Infusion), begleitende oder nachfolgende Maßnahmen sind nicht völlig frei von Risiken. Selten treten Kreislaufschwäche, örtliche Gewebeschäden auf (Venenentzündung, Spritzenabszess, Bluterguss). Anhaltende Nervenschäden trotz ordnungsgemäßer Lagerung sind sehr selten.
- Nach der Untersuchung auftretende Schluckbeschwerden, leichte Heiserkeit oder Blähungen verschwinden nach einigen Stunden von selbst.
- Zahnschädigungen durch das Endoskop oder den Beißring sind sehr selten.

Alternativen

Krankhafte Veränderungen des oberen Verdauungstraktes können mit Einschränkung auch durch Ultraschall, Röntgenverfahren mit Kontrastmittel (u.a. Computertomographie), Kernspintomographie erkannt werden. Diese Verfahren sind ungenauer, da die Schleimhaut nicht direkt betrachtet werden kann und keine Gewebeproben entnommen werden können. Somit ist häufig eine Zweituntersuchung erforderlich. Die Röntgenverfahren weisen zudem eine Strahlenbelastung auf.

Verhalten vor der Spiegelung

Damit der Magen frei von Speiseresten ist, dürfen Sie mindestens 6 Stunden vorher nichts mehr essen und nicht rauchen. Bis 2 Stunden vorher können Sie noch klare Flüssigkeit trinken (Wasser, Tee).

Hinweise zur Medikamenteneinnahme vor der Untersuchung:

Notwendige Arzneimittel („Dauermedikamente“) können Sie auch am Untersuchungstag bis spätestens 2 Stunden vor der Untersuchung mit einem Glas Wasser einnehmen (Ausnahmen s.u.).

Ausnahmen:

- Blutzuckersenkende Medikamente: Morgendosis nicht einnehmen.
- Insulinbehandlung: Morgendosis nicht vor der Untersuchung injizieren.



Fragebogen (Anamnese)

Patient/in: Name, Vorname, Geb.-Datum

Zur Beurteilung der Risiken benötigt der Arzt folgende Informationen:

Leiden Sie unter einer der folgenden Erkrankungen? (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

- Herz-Kreislaufferkrankung (z.B. Herzfehler, Herzklappenentzündung, Herzrhythmusstörung, Angina pectoris, Herzinfarkt, Bluthochdruck) Nein Ja
- Lungenerkrankungen (z.B. Raucherasthma, chronische Bronchitis) Nein Ja
- Störung der Blutgerinnung Nein Ja
- Chronisch infektiöse Erkrankungen (z.B. Hepatitis, HIV) Nein Ja
- Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus) Nein Ja
- Sonstige chronische Erkrankungen (z.B. Grüner Star, Epilepsie)
Wenn ja: welche: Nein Ja
- Allergien (z.B. Latex, Pflaster, Medikamente, örtliche Betäubungsmittel) Nein Ja
- Operationen am Magen-Darm-Trakt / Bauchraum
Wenn ja: welche: Nein Ja
- Tragen Sie einen Herzschrittmacher, Defibrillator oder eine Metallprothese (z.B. Hüftendoprothese) Nein Ja
- Besteht eine Schwangerschaft Nein Ja
- Nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein
Wenn ja: welche: Nein Ja
- Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein (z.B. Marcumar, ASS, Plavix, Falithrom, Clopidogrel, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) Nein Ja
- Haben Sie lockere Zähne oder Zahnersatz Nein Ja
- Sonstige Anmerkungen:



Praxis für Gastroenterologie Altstadt Spandau

Dr. med. Ch. Janiszewski - Wolfgang Roth
Breite Straße 47 - 13597 Berlin - Telefon: **030 29 77 20 50**

Einverständniserklärung

.....
Patient/in: Name, Vorname, Geb.-Datum

Ich wurde über die geplante **Ösophago-Gastro-Duodenoskopie** umfassend informiert. Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstanden. Ich habe keine weiteren Fragen und möchte die Untersuchung durchführen lassen.

Ja Nein

Ich wurde über die besonderen Risiken der Sedierung (Beruhigungsspritze) aufgeklärt und wünsche eine Sedierung.

Ja Nein

Falls ja, versichere ich hiermit, dass ich nicht selbst mit einem Fahrzeug (Fahrrad, Auto etc) nach Hause fahren werde, sondern eine sichere Heimfahrt mit einer erwachsenen Begleitperson organisiert habe.

Den Informationsteil habe ich zum Mitnehmen/ zur Verwahrung erhalten. Die Verhaltenshinweise werde ich beachten.

Ja Nein

Geplanter Termin:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Patient/in

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Arztes